

BLUEMILLA 10ml

BLUEMILLA è una soluzione oftalmica sterile, a pH fisiologico, a base di ialuronato di sodio, con benzalconio cloruro come conservante.

L'azione principale del dispositivo è quella di lubrificare e idratare la superficie oculare, grazie al sodio ialuronato. BLUEMILLA aiuta ad idratare e rinfrescare l'occhio.

BLUEMILLA è indicato per contrastare i sintomi della secchezza oculare quindi allevia rossore, irritazione e affaticamento oculare.

La formula contiene anche cloruro di sodio e tampone fosfato per garantire una soluzione fisiologica e acque distillate di camomilla e fiordaliso per assicurare un'azione idratante.

INDICAZIONI D'USO

Gocce oculari indicate per contrastare i sintomi dell'occhio secco e alleviare irritazione, rossore e affaticamento oculare dovuti a fattori ambientali (aria condizionata, esposizione prolungata a raggi solari, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o piscina), utilizzo di lenti a contatto, computer e guida prolungata.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato 0.1%, Acqua distillata di Fiordaliso, Acqua distillata di Camomilla, Sodio fosfato bibasico eptaidrato, Sodio fosfato monobasico biidrato, Polisorbato 80, Sodio cloruro, Benzalconio cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Prima del primo utilizzo, svitare con decisione il tappo di protezione per rompere il sigillo di garanzia;
- Aprire il flacone ruotando il tappo di protezione in senso antiorario;
- Rimuovere il tappo protettivo;
- Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione per instillare 2 o 3 gocce nell'occhio;
- Dopo l'uso, richiudere il contenitore ruotando il tappo di protezione in senso orario.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Data la presenza di benzalconio cloruro, non utilizzare il prodotto se si hanno patologie oculari (es. glaucoma, neuropatia ottica ereditaria di Leber).
- Il prodotto è destinato ad essere utilizzato da adulti e anziani e si raccomanda di consultare il medico in caso di utilizzo sui bambini.
- Dopo la prima apertura del flacone, utilizzare il prodotto entro 28 giorni. Trascorso tale periodo gettare il contenuto residuo.
- Non utilizzare il prodotto più di 3 volte al giorno.
- Rimuovere le lenti a contatto prima di utilizzare il prodotto e attendere almeno 15 minuti dopo aver utilizzato il prodotto prima di applicare le lenti a contatto.
- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è mono paziente.
- Non utilizzare se il sigillo di garanzia presente sul tappo del flacone è rotto.
- Non utilizzare il prodotto se si osservano particelle e/o alterazioni del colore della soluzione.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sul flacone.
- Non usare in caso di allergia verso qualsiasi componente di questo prodotto.
- Non usare in caso di allergie alle piante appartenenti alla famiglia delle Asteraceae.
- Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati presenti in questo prodotto possono causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il trattamento.
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altri colliri; attendere comunque 15 minuti prima di instillare qualsiasi altra goccia oculare.
- In caso di effetti collaterali durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Smaltire il prodotto in accordo alla normativa locale sui rifiuti.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.
- Solo per uso esterno. Non ingerire.
- Segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.

EFFETTI COLLATERALI

Al momento non sono noti effetti collaterali.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura ambiente (15°C-25°C).

Il contenuto deve essere utilizzato entro 28 giorni dalla prima apertura.

CONFEZIONAMENTO

Un flacone da 10 ml.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone.



DT/01/DT/014



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Distribuito da:

Ultima Revisione: 01.01 del 02/2023



C.O.C. Farmaceutici srl

Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
PIVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476